



BARRIDO DIAGNÓSTICO CON 131I O LUEGO DE TERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE TIROIDES

Busca valorar la captación de restos tiroideos y extra tiroideos post cirugía luego de la administración de Iodo 131 con fines de diagnóstico (barrido diagnóstico) o después de un tratamiento en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. El paciente debe suspender la hormona tiroidea entre 3-6 semanas o hasta que el TSH se encuentre mayor a 30 para poder administrar el 131I.

Cuando es un barrido diagnóstico las imágenes se adquieren 72 horas luego de la administración del radiofármaco. En el barrido post terapia se adquiere entre 8-12 días luego de la terapia. El paciente debe tomarse un enema tratav a fin de que el intestino este limpio y se tenga buena calidad de las imágenes buena calidad

REQUISITOS PARA EL EXÁMEN

Presentar la orden médica con los datos clínicos y la respectiva autorización de servicios de la medicina prepagada o EPS. Solicitar cita previa al servicio de medicina nuclear será valorado por el médico nuclear quien le informara sobre las características del procedimiento.

PREPARACIÓN

- Prueba de embarazo en sangre (no mayor a tres días) a la cita del estudio para mujeres en edad reproductiva, desde el primer período menstrual hasta la menopausia, se solicita prueba de embarazo a mujeres con menopausia post quimioterapia.
- No aplica el punto anterior para mujeres con histerectomía, casos especiales comentar en el servicio.
- Informar al personal si está en período de lactancia.

- No puede haberse realizado estudios con medio de contraste los días previos al estudio, en caso de que se haya realizado se debe esperar mínimo 3 meses para realizar la gamagrafía.
- No haberse tinturado el cabello 15 días antes del estudio.
- Traer exámenes de laboratorio (TSH) Tiroglobulina y anticuerpos si los tiene.
- **Suspender los siguientes medicamentos:**
 - 4 a 6 semanas: **Hormona Tiroidea:** Eltroxin, Tetroxin, Euthyrox, Cynomel, Eutroid, Syntroid, Proloid.
- Tener un ayuno previo a la cita como mínimo de 4 horas.
- Realizar dieta mínimo 5 días según indicación del médico nuclear, en la valoración le entregara el folleto informativo.
- 15 días antes del estudio no usar pomadas mentoladas, ni calientes o frías como menticol, vick vaporub, lilimento, productos naturales a base de sábila para adelgazar, ni a base de Yodo, Yodosalid.
- Suspender aromáticas, té, tisanas, medicamentos homeopáticos.
- Si el estudio se realiza bajo estímulo de Thyrogen, el médico nuclear le entregara por escrito las indicaciones de su administración
- No haberse realizado biopsias o punciones en el cuello 15 días antes del procedimiento, después de cirugías de cuello esperar un mes.
- Las acompañantes de los pacientes no pueden ser mujeres en gestación o traer menores.

DURACIÓN: La realización del estudio se toma imágenes de 1 hora, sin embargo hay factores como retrasos en el programa, emergencias u otros pueden retrasar el comienzo del procedimiento o prolongar su duración.

IMPORTANTE: Si por algún motivo no es posible asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después de ella, **por favor comunicarse al teléfono 6805757**. El día del estudio los pacientes no deben estar cerca de mujeres en embarazo ni menores de 10 años. Guardar como mínimo un metro de distancia.

HORARIOS DE ATENCIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE CITAS:

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

www.valledellili.org

• Av. Simón Bolívar. Cra 98 # 18 - 49 • Cali - Colombia • Citas:57(2) 680 57 57 •